УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ Е.А. НЕПОКЛОНОВ
_____
15 ОКТ 2014

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Даны® Спот-он для борьбы с эктопаразитами плотоядных животных

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дана® Спот-он (Dana Spot-on).

Международное непатентованное наименование: фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Дана® Спот-он содержит в 1 мл в качестве действующего вещества фипронил – 50 мг и вспомогательные вещества: спирт изопропиловый – 300 мг, диметилформамид – 100 мг, кислоту лимонную – 1 мг и полиэтиленгликоль – до 1 мл.

3. Выпускают препарат в полиэтиленовых тюбик-пипетках, расфасованным по 0,5; 1,0; 1,5; во флаконах с крышкой-капельницей, расфасованным по 15 мл. Тюбик - пипетки одного объема по 3 или 4 штуки, флаконы поштучно, упакованы в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2°С до 25°С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применение Даны® Спот-он по истечении срока годности.

5. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Дана® Спот-он относится к инсектоакарицидным препаратам группы фенилпирозолов.

Фипронил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает выраженной инсектоакарицидной активностью в отношении преимагинальных и имагинальных фаз развития блох (Stenocephalides canis, Stenocephalides felis) вшей (Linognatus setotus), власоедов (Trichodectes canis), саркоптоидных (Sarcoptes canis, Sarcoptes vulpis, Notoedres cati, Otodectes cynotis, Psoroptes cuniculi), иксодовых (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis) и демодекозных (Demodex canis) клещей.

Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели насекомых и клещей.

После нанесения препарата на кожу фипронил, практически не всасываясь в системный кровоток, распространяется по кожно-волосяному покрову животного, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывая контактное инсектоакарицидное действие, которое проявляется через 12-24 часа и продолжается на протяжении 4-6 недель после однократной обработки животного.

Дана® Спот-он по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

8. Дану® Спот-он назначают собакам и кошкам с 12-недельного возраста для лечения и профилактики энтомозов, вызываемых блохами, вшами и власоедами, акарозов, вызываемых саркоптоидными, иксодовыми и демодекозными клещами, пушным зверям – для лечения и профилактики отодектоза.

9. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата, в том числе в анамнезе. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, собаки массой менее 2 кг, котята и щенки моложе 12-недельного возраста. Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки. Беременным и лактирующим самкам Дану® Спот-он при необходимости применяют под контролем ветеринарного врача.

10. Дану® Спот-он для лечения и профилактики энтомозов и акарозов, вызываемых иксодовыми клещами, применяют однократно путем капельного нанесения («spot-on») на сухую неповрежденную кожу в места недоступные для слизывания животным (область спины между лопатками или область шеи у основания черепа), выбирая тюбик-пипетку необходимого объема с учетом вида и массы обрабатываемого животного, в дозах, указанных в таблице:

Таблица

Вид и масса животного, кг	Доза на животное	
	препарата, мл	количество пипеток и номинальный объем
Взрослые собаки и щенки		
до 10 кг	1,5 мл	1 пипетка 1,5 мл
от 10 кг до 20 кг	3,0 мл	3 пипетки х 1 мл *
от 20 кг до 40 кг	4,5 мл	3 пипетки х 1,5 мл *
более 40 кг	6,0 мл	4 пипетки х 1,5 мл*
Взрослые кошки и котята		
от 1 кг до 3 кг	0,5 мл	1 пипетка 0,5 мл
более 3 кг	1,0 мл	1 пипетка х 1,0 мл

* или комбинация пипеток других объемом

Повторные обработки животных в сезон наибольшей активности паразитов проводят по показаниям, но не чаще одного раза в месяц, при частом мытье животного с моющим средством (более 2 раз в месяц) – не чаще 1 раза в 2 недели.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их разрешенным к использованию инсектицидным препаратом в соответствии с инструкцией по применению.

Акарицидное действие фипронила начинается спустя 24 часа после нанесения препарата, в связи с этим обработки следует проводить не позднее, чем за сутки до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания клещей (парки, скверы, лес).

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве 1-2 капель наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20-30 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из тела и уничтожают.

Для лечения собак, кошек и пушных зверей при отодектозе (ушной чесотке) наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок, затем закапывают в каждое ухо по 3-5 капель препарата, ушную раковину складывают вдоль пополам и массируют ее основание. Обработку повторяют 2-3 раза с интервалом 5-7 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

Лекарственный препарат обязательно вводят в оба уха, даже в случае выявления клинических признаков заболевания только в одном ухе.

При поражении собак и кошек саркоптозом, нотоэдрозом или демодекозом препарат наносят тонким слоем на предварительно очищенные от струпьев пораженные участки тела тампоном от периферии к центру с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см, в дозах, указанных в таблице. При тяжелом течении заболевания лечение животного рекомендуется проводить комплексно с применением патогенетических и симптоматических лекарственных средств. Обработку проводят 3-5 раз с интервалом 7-10 суток до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом 1 день, нанося препарат сначала на одну, а затем на другую половину пораженной поверхности тела.

Для предотвращения слизывания препарата животным надевают шейный воротник, намордник или смыкают челюсти петлей из тесьмы, которые снимают через 20-30 минут после нанесения препарата.

Не следует наносить препарат на влажную и/или поврежденную кожу, купать животное в открытых водоемах, а также мыть с моющим средством в течение 48 часов после обработки.

11. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

12. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки следует ее провести как можно скорее, в той же дозе.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У некоторых животных при индивидуальной повышенной чувствительности и появлении признаков раздражения кожи и аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

15. Дану® Спот-он не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами для обработки животных.

16. Препарат не предназначен для обработки продуктивных животных.

IV. Меры личной профилактики

17. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Даны® Спот-он следует использовать резиновые перчатки. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу.

18. Не следует гладить и допускать контакта детей с обработанными животными в течение 24 часов после нанесения препарата. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с Даной® Спот-он. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Пустые тюбик-пипетки и флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей; их помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Инструкция разработана ООО «АПИ-САН»; 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Даны® Ультра, утвержденная Россельхознадзором 13 декабря 2013 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения: