

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Амидель-гель[®] Нео для лечения саркоптоидозов
у плотоядных животных
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Амидель-гель[®] Нео (Amidel-gel Neo).

Международное непатентованное наименование: цифлутрин, лидокаин, хлорамфеникол.

2. Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Амидель-гель[®] Нео в 1 г в качестве действующих веществ содержит: цифлутрин – 1,5 мг, хлорамфеникол – 10 мг, лидокаина гидрохлорид – 50 мг и вспомогательные вещества: глицерин, диметилсульфоксид, Na – карбоксиметилцеллюлозу, полиэтиленгликоль - 400, отдушку Coscreme D и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой непрозрачный гель от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности Амидель-геля[®] Нео при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 2, 5, 10 и 12 г в полимерные шприцы-дозаторы, которые упаковывают поштучно в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25 °С.

6. Амидель-гель[®] Нео следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Амидель-гель[®] Нео относится к комбинированным лекарственным препаратам с акарицидным и противомикробным действием.

10. Цифлутрин, входящий в состав препарата, относится к группе синтетических пиретроидов, обладает контактным инсектоакарицидным

действием, блокируя передачу нервных импульсов, вызывает паралич и гибель членистоногих. После нанесения препарата на кожу цифлутрин, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывая длительное контактное инсектоакарицидное действие.

Лидокаина гидрохлорид – амидный мембраностабилизирующий местный анестетик, подавляет активность чувствительных нервных окончаний кожи, обратимо тормозит проведение нервных импульсов в нейронах, аксонах и синапсах, угнетает тактильную чувствительность, болевую реакцию и устраняет зуд. Анестезирующий эффект проявляется через 1-5 минут. Скорость абсорбции и количество лидокаина, поступившего в системный кровоток, зависит от дозы препарата и площади обрабатываемой поверхности, максимальная концентрация в плазме крови отмечается через 1 час и сохраняется на терапевтическом уровне до 8 часов; метаболизируется в печени, выводится главным образом с мочой в неизменной форме и в виде метаболитов; период полувыведения из организма составляет в пределах 1,6 часа.

Хлорамфеникол – антибиотик группы амфениколов, механизм бактериостатического действия которых связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Активен в отношении грамположительных (*Staphilococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) и грамотрицательных (*Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*) кокков, а также *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Serratia spp.*, *Proteus stuartii*, *Yersinia spp.*, риккетсий, актиномицет, спирохет и некоторых крупных вирусов, включая штаммы микроорганизмов, устойчивые к пенициллину, сульфаниламидам и стрептомицину.

Амидель-гель[®] Нео по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, сенсibiliзирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Амидель-гель[®] Нео применяют для лечения плотоядных животных при нотоэдрозе, саркоптозе, отодектозе, в том числе осложненных бактериальной инфекцией.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При саркоптозе и нотоэдрозе Амидель-гель[®] Нео наносят тонким слоем на предварительно очищенные от струпьев и корок пораженные места, из расчета 0,5 г/кг массы животного, равномерно распределяя от периферии к центру с захватом здоровой кожи до 1 см.

Для предотвращения слизывания препарата животному одевают намордник, шейный воротник или смыкают челюсти петлей из тесьмы, которые снимают через 20-30 минут после нанесения геля. Обработку

проводят 2-5 раз с интервалом 5-7 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами микроскопических исследований.

Животных с обширными поражениями кожи обрабатывают в два приема с интервалом в один день, нанося гель сначала на одну половину пораженной поверхности туловища, затем на другую.

При акарозах, осложненных бактериальной инфекцией, рекомендуется применение иммуномодулирующих препаратов.

При отодектозе (ушной форме чесотки) наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок смоченным в геле тампоном, затем вводят в каждое ухо по 0,5- 2,0 г геля (в зависимости от размера животного).

С целью более полной обработки всей поверхности уха и слухового прохода, ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание.

Обработку проводят 1-2 раза с интервалом в 3-5 дней, в запущенных случаях, осложненных отитами, назначают противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 5-7 суток.

Амидель-гель[®] Нео обязательно вводят в оба уха даже при поражении отодектозом только одного.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Не следует применять Амидель-гель[®] Нео котят и щенкам моложе 4-недельного возраста, беременным и кормящим самкам.

17. В случае пропуска очередной обработки, необходимо провести её как можно скорее в той же дозе, далее интервал между обработками не изменяется.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Амидель-геля[®] Нео, как правило, не наблюдается. В редких случаях у животного возможно появление местной кожной реакции в виде эритемы, которая исчезает без применения терапевтических средств.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и развитии аллергических реакций использование Амидель-геля[®] Нео прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Амидель-гель[®] Нео не следует применять одновременно с другими акарицидными средствами для обработки животных.

20. Амидель-гель[®] Нео не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Амидель-гель[®] Нео следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Запрещается использование пустых шприцев из-под лекарственного препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Не следует гладить животное и подпускать его к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Амидель-гель[®] Нео. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть струей проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО НПО «Апи-Сан»,
Московская область,
Балашихинский район,
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан»,
Московская область,
Балашихинский район,
Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Амидель-гель[®] Нео, утвержденная Россельхознадзором от 26 июня 2015 года.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-4.15-2659 № ПВР-3-4.15/03150